mucosa

Volume 2, Supplement 1
www.mucosa.org



KONGRE ÖZET KİTABI



ISSN 2651-2750

The Society of Eastern Black Sea Dermatology and Venereology

Değerli Meslektaşlarımız,

1.Karadeniz Pediatri Günleri'nin 3-5 Ekim 2019 tarihleri arasında Trabzon'da düzenleneceğini duyurmak ve sizleri davet etmekten büyük mutluluk duymaktayız.

Tıbbın bütün alanlarında olduğu gibi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında da hızlı bilgi artışının yanı sıra aynı hızda bir bilgi kirliliği de ortaya çıkmaktadır. Amacımız, konularının uzmanlarıyla sizleri buluşturarak; bilimsel standardı yüksek konferanslar, paneller, uydu toplantıları ve kurslar aracılığıyla bilgilerinizi en doğru biçimde güncellemektir. 1. Karadeniz Pediatri Günleri'nin ilk günü kurslara, sonraki günler ise kongre, panel ve uydu toplantılara ayrılmıştır. Ayrıca, sözlü bildirilere ve posterlere de yer verilecektir. Bilim kurulu tarafından seçilen bir kısmı serbest bildiri ve posterlere teşvik ödülleri vermeyi planlamaktayız. Özgün ve orijinal çalışmalarınızı sunmak üzere hazırlamanızı bekliyoruz.

Gün boyu devam edecek bilimsel programın yanı sıra ilginizi çekeceğini umduğumuz sosyal programlara da yer vereceğimiz 1. Karadeniz Pediatri Günleri'nde pediatri uzmanlarını, tıpta uzmanlık öğrencilerini, pratisyen hekimlerini, aile hekimlerini ve pediatri ile ilgili hemşire ve diğer sağlık çalışanlarını aramızda görmeyi bekliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Prof. Dr. Fazıl Orhan
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

Bulgular

Toplamda 25OHD düzeyi tetkik edilen 53 olgu (24 kız olgu) dahil edildi. Olguların yaşları 23.4 (6.9-97.6) ay, 25OHD düzeyleri 15.15 (6.78-24.6), parathormon düzeyleri 29.5 (17.6-99) kalsiyum, fosfor ve alkalen fosfartaz düzeyleri ise sırasıyla 8.7(7.9-9.6), 4.55 (3.6-5.4), 135 (96-245) olarak tespit edildi. Hastaların 25OHD düzeyi ile yatış süresi arasında korelasyon görülmedi (r=0.24 p=0.077). Olguların dördü kaybedildi. Kaybedilen olgularla diğer olgular arasında 25OHD düzeyleri açısından anlamlı fark görülmedi (p=0.644). serebral palsi ya da epileptik sendromlar gibi kronik hastalığı olan 30 (%44.4) olguda 25OHD düzeyi diğer olgulara göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p=0.009).

Tartışma

Çocuk yoğun bakım hastalarında D vitamini düzeyleriyle mortalite ya da yoğun bakım yatış süreleri arasında ilişki görülmemektedir.

YS37. Konjenital sifiliz: Farklı klinik presentasyonlarla giden önlenebilir bir hastalık üçüncü basamak yenidoğan yoğun bakım deneyimleri (Tam metin)

Hakan Ongun[1], Meltem Demir[2]

[1]İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Afiliye Antalya Medical Park Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Bölümü, Antalya, [2]İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Afiliye Antalya Medical Park Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bilim Dalı, Antalya

Giriş

Konjenital sifiliz, insidansı giderek artan, tanıda gecikme durumunda mortalitesi ve morbiditesi yüksek olan konjenital enfeksiyonların başındadır.[1] Pekçok yenidoğanın, erken dönemde asemptomatik olabildiği bilinmektedir.[2] Prenatal öykünün olmadığı olgularda, süphelenmedikçe tanıda gecikmeler görülebilir. Bu sebeple, üçüncü basamak yenidoğan yoğun bakıma servisine (YYBÜ), farklı klinik şikayet ve bulgularla yatıp, konjenital sifiliz tanısı alan sekiz olgu tartışılmıştır.

Metod

2014-2018 yıllarında İstinye Üniversitesi affiliye Antalya Medical Park Hastanesi YYBÜne farklı şikayet ve tanılarla yatıp sifiliz tanısı alan sekiz olgunun klinik presentasyonlarını içeren demografik ve laboratuvar verileri incelenmiştir.

Bulgular

Olguların, gestasyonel yaşlarının 35.37±2.26 hafta, doğum kilolarının 2431.87±372.51 gram olduğu, iki olgu dışında tüm olguların 37 hafta ve altında prematüre oldukları görülmüştür. Tablo I'de olguların klinik ve laboratuvar bulguları görülmektedir. Dört olgu doğum sonrası ilk 10 günlük süreçte farklı şikayetlerle YYBÜ'ne yatırılmış, yatış esnasında hiç bir hastada şüpheli aile öyküsüne rastlanmamıştır. Başvuru şikayetleri sırasıyla, huzursuzluk ve emme bozukluğu (beş olgu), ateş ve solunum sıkıntısı (dört olgu), sarılıkve özgün olmayan döküntü (üç olgu), batında yaygın sıvıdır. Nonimmun hidrops tanılı bir olgu dışında tüm olguların sepsis ön tanısıyla yatırıldığı, muayenede yedi olguda hepatomegali, dört olguda ise splenomegali gözlendiği, analizlerde tüm olgularda değişen oranlarda trombositopeni (platelet < 100.000mm^3) ve dört olguda aya göre düzeltilmiş anemi saptanmıştır. Üç olguda özgün olmayan döküntü mevcuttur. Trombositopeni ve hepatomegali etyolojisi araştırılırken, VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) pozitifliği saptanan olgular, TPHA (Treponema pallidum particle agglutination assay) ile teyit edilerek sifiliz tanısı konmuştur. Tanı ardından anne baba taramaları yapılmak üzere hasta yakınları yönlendirilmiştir. Toplam yatış süresinin 17.28±1.38 gün olduğu çalışmada bir hasta kaybedilmiştir.

Tartışma

Tedavi edilmediği takdirde %70 olasılıkla transplasental geçiş olan Trepanoma palllidum enfeksiyonu gebeliğin tüm trimesterlerinde bulaşıcılığı olan, farklı klinik bulgularla seyreden bir spiroket enfeksiyonudur[1] Olguların büyük kısmı, erken dönemde asemptomatik yada özgün olmayan bulgular verirler.[3] Çalışmamızda da bir olgunun non-immun hidrops ile doğduğu, diğer tüm olguların halsizlik ve beslenme bozukluğu şikayetleriyle gelerek sepsis ön tanısıyla YYBÜ'ne yatırıldığı, gözlenen döküntülerin hastalığa özgün olmadığı, trombositopeni, hepatomegali ve

anemi etyolojisi araştırılırken sifiliz tanıları aldıkları görülmüştür. Konjenital sifiliz, erken dönem bulgularının özgün olmaması nedeniyle şüphelenilmediği takdirde gözden kaçma ihtimali olan, önlenebilir bir hastalıktır. Prenatal

Tablo 1. Olguların demografik ve klinik verileri

	Olgu-1	Olgu-2	Olgu-3	Olgu-4	Olgu-5	Olgu-6	Olgu-7	Olgu-8
Anne yaşı	21 yaş	27 yaş	20 yaş	32 yaş	17 yaş	16 yaş	27 yaş	25 yaş
Gebelik sayısı	2	3	1	3	1	1	3	1
Yaşayan sayısı	2	2	1	3	1	1	2	1
Gebelik haftası	34 hafta	36 hafta	33 hafta	38 hafta	32 hafta	35 hafta	38 hafta	37 hafta
Doğum şekli	Sezeryan	Sezeryan	Sezeryan	Sezeryan	NSVY	NSVY	NSVY	Sezeryan
Doğum kilosu	2550 gram	2400 gram	2100 gram	2450 gram	1730 gram	2950 gram	2625 gram	2650 gram
Başvuru zamanı	10 günlük	5 günlük	3 günlük	30 günlük	1 günlük	1 günlük	90 günlük	45 günlük
YYBÜ yatış süresi	17	18	16	20	16	15	18	17
Sonuç	Taburcu	Taburcu	Taburcu	Taburcu	Taburcu	Exitus	Taburcu	Taburcu
Huzursuzluk	-	+	-	+	+	-	+	+
Ateş	+		+	-	-	-	+	+
Emme bozukluğu	+	-	+	+	-	-	+	+
Sarılık	+	-	+	-	-	-	+	-
Solunum sıkıntısı	-	-	-	+	+	+	-	+
Batında sıvı	-	-	-	-	-	+	-	-
Hepatomegali	+	+	+	+	+	+	+	+
Splenomegali	-	+	-	+	-	-	+	-
Taşikardi	-	-	-	+	+	-	-	+
Takipne	-	+	-	+	+	+	-	+
Döküntü	-	-	Deride soyulma	Maküler lezyon	-	-	Plantar papül	-
Anemi	+	-	+	-	+	-	+	+
Trombositopeni	+	+	+	+	+	+	+	+
VDRL	+	+	+	+	+	+	+	+
TPA	+	+	+	+	+	+	+	+

tanısı da mümkün olan toplum sağlığı açısından önemli bir halk sağlığı problemidir.

Kaynaklar

1. Cooper JM, Sánchez PJ. Congenital syphilis. Semin Perinatol 2018;42:176-84.
2. Patel NU, Oussedik E, Landis ET, Strowd LC. Early congenital syphilis: Recognising symptoms of an increasingly prevalent disease. J Cutan Med Surg 2018;22:97-9.
3. Feliz MC, de Medeiros ARP, Rossoni AM3, et al. Adherence to the follow-up of the newborn exposed to syphilis and factors associated with loss to follow-up. Rev Bras Epidemiol 2016;19:727-39.

YS38. İmmun ve immun olmayan yenidoğan sarılıklarında karboksihemoglobin düzeyleri ve etkileyen faktörler: retrospektif çalışma sonuçlarımız

İlkay ER[1]

[1]*SBÜ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi, Kocaeli*

1. KARADENİZ PEDİATRİ GÜNLERİ

3-5 EKİM 2019

KTÜ OSMAN TURAN KONGRE MERKEZİ

TRABZON

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ • 1955 •

Hakan ONGUN

3-5 Ekim 2019 tarihleri arasında Trabzon'da düzenlenen 1.KARADENİZ PEDİATRİ GÜNLERİ'ne katılmıştır.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ • 1973 •

KTÜ PEDİATRİ DERNEĞİ 2018

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Fazıl ORHAN