TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ
1989

28. Ulusal Neonatoloji Kongresi

10 - 14 ARALIK 2020

(UNEKO 28)



BİLDİRİ ÖZETLERİ

İÇİNDEKİLER

KLİNİK SÖZLÜ BİLDİRİLER	4
DENEYSEL SÖZLÜ BİLDİRİLER	40
TARTIŞMALI POSTERLER	48
OLGU POSTERLER	75
E-POSTERLER	89
YAZAR DİZİNİ	514

EPB12 - BLUE RUBBER BLEB NEVUS SENDROM

CELAL SAĞLAM , İPEK ACARBULUT , HAKAN ONGUN , KIYMET ÇELİK , NİHAL OYGÜR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ *ÇOCUK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI* NEONATOLOJİ BİLİM DALI, ANTALYA

Giriş:

Blue rubber bleb nevus sendromu (BRBNS) deride hemanjiomlarla ve gastrointestinal sistemde vasküler tümörlerle karakterize nadir bir durumdur. Genellikle sporadik olarak oluşur, fakat otozomal dominant geçiş de bazı ailelerde gösterilmiştir. Lezyonlar doğumda ve erken çocukluk döneminde oluşarak, yaşla birlikte boyutları ve sayısında artış görülür. Bu hemanjiomlar gastrointestinal kanama ve anemiye neden olabilirler. Küratif bir tedavisi halen bulunmamaktadır. Yaygın cilt ve viseral organ tutulumu eşlik eden ve literatürlerde bildirilen tedavilere rağmen masif kanama nedeniyle kaybedilen bir olgu sunulmuştur.

Olgu:

25 yaşındaki talasemi taşıyıcısı anneden sezaryen ile 38 haftalık 4210 g dış merkezde doğan kız bebek, postnatal 2.gününde yaygın hemanjiomatoz lezyonları nedeniyle gönderildi (Resim 1). nCPAP desteğiyle getirilen yenidoğanın; genel durumu orta, cildi soluk, ılımlı takipnesi (solunum:62/dk) dışında diğer vitalleri stabildi. Vücutta yaygın ve yer yer kanayan hemanjiomları mevcuttu. Organomegali saptanmadı, vulvar bölgedeki obstrüktif lezyon nedeniyle dış merkezde yerleştirilen suprapubik kateter, lezyon eksize edilip üriner sonda takıldıktan sonra çıkarıldı. Trombositopeni (19.000/mm^3) ve anemi (10.2 g/dl) dışında; diğer hemogram, biyokimyasal ve koagulasyon tetkikleri normal sınırlardaydı. Klinik, radyolojik ve histopatolojik olarak BRBNS tanısı konuldu. Santral sinir sistemi ve yaygın viseral organ tutulumu olan yenidoğana destek tedavileri dışında; propranolol, prednizolon ve Rapamisin inhibitörü (Sirolimus) başlandı. Postanatal 38.gününde akciğer tutulumunu düşündürür, masif endotrakeal tüp içi kanama nedeniyle hasta kaybedildi.



Sonuç:

Hemanjiomatoz lezyonları olan yenidoğanlarda ayırıcı tanıda BRBNS düşünülmelidir. Olgumuz, bilgimiz dahilinde, literatürde var olan vakalar arasında en yaygın sistemik tutulumu olan ve akciğer kaynaklı (endotrakeal tüp içi kanama) kanama nedeniyle kaybedilen ilk olgudur.

Anahtar Kelimeler: Blue rubber bleb nevus sendrom, Hemanjiom, Yenidoğan

Sanal

28. Ulusal Neonatoloji Kongresi

10-14 Aralık 2020

(UNEKO 28)

TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ 1989

KATILIM SERTİFİKASI

Hakan Ongun

10-14 Aralık 2020 tarihleri arasında düzenlenen

*"**28. Ulusal Neonatoloji Sanal Kongresi**"ne katılmıştır.*

Prof. Dr. Nuray Duman
Kongre Sekreteri

Prof. Dr. Esin Koç
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Merih Çetinkaya
Kongre Sekreteri